

Blín

Hnojené zahradní a polní plodiny občas zapleveluje blín černý (*Hyoscyamus niger*), jednoletá ozimá nebo dvouletá bylina vysoká 0,2 – 0,8 m, celá lepkavě chlupatá a zapáchající. Hojný je hlavně v teplejších územích našeho státu, nezřídka roste na rumišťích, úhorech, u cest ap. Lodyha je tupě hranatá, laločnaté listy mají zašpičatělé úkrojky. Květy mají baňkovitý kalich a nálevkovitou, špinavě žlutou korunu. Kvete od června až do podzimu, plodem je tobolka uzavřená ve vytrvávajícím kalichu.



Celá rostlina obsahuje prudce jedovaté alkaloidy (hyoscyamin, atropin aj.), zvl. v semenech. Uvádí se , že smrtelnou dávkou pro dítě je požití již 10 – 20 velmi drobných semen. Po požití kterékoliv části rostliny je nevyhnutelná lékařská pomoc.

Mnohostranné využití měl blín ve středověku – sloužil mj. k omámení pacientů při bolestivých operacích a k utišení bolestí zubů, ale i jako součást čarodějných mastí, kouzelných nápojů a jako účinný prostředek k odstranění nepřátel otrávením.

Doc. RNDr Jan Novák, DrSc,
foto: Ing. Helena Nováková
Bonsai Zahrada Kunice
www.bonsai-info.cz