

## Řemenatka oranžová (klívie) – *Clivia miniata* Regel Pok., 0,8m, II-V

Rostlina je nápadná trsy hřebenitých listů sestavených ve dvou řadách. Listy jsou až 0,5 m dlouhé, tuhé a temně lesklé. Nápadné elegantní květenství na silném stvolu je tvořeno až dvaceti oranžovými, někdy téměř červenými květy. Plod je tobolka.

Celá rostlina je jedovatá neboť obsahuje specifické alkaloidy lykorin, klivimin a klivatin. Při intoxikaci se dostavuje slinění, zvracení a průjem, větší dávky mohou způsobit ochrnutí až



kolaps. Po nezbytné první pomoci je potřebné lékařské vyšetření. Zejména v listech je obsažena žlutá mléčná šťáva.



Řemenatka pochází z jižní Afriky a často se pěstuje pro zajímavý vzhled listů a zejména květů. Vyhovuje jí rozptýlené světlo, polostín i mírné zastínění. Na ošetřování je nenáročná, v létě je zapotřebí vydatná zálivka a vhodná je vyšší vzdušná vlhkost, v době vegetace se může hnojit každý týden.

Doc. RNDr Jan Novák, DrSc

Foto: Ing Helena Nováková

[www.bonsai-info.cz](http://www.bonsai-info.cz)